

# Bijvoeden op de neonatalogie

in het samenspel tussen moeder en kind

# Inhoud

- ▶ Situatie
- ▶ Opname op de couveuse afdeling
- ▶ Van lactatie naar het geven van borstvoeding
- ▶ Methode van bijvoeden
  
- ▶ De match!

# Situatie

- ▶ Antonius Ziekenhuis Sneek
  - Het cluster 'Vrouw en kindzorg'
    - Kraamafdeling met verloskamers
    - Couveuse afdeling
    - Kinderafdeling
  
- ▶ 2009: behalen van het WHO-UNICEF Certificaat Zorg voor Borstvoeding

# Situatie

- ▶ Geschiedenis van:
  - Borstvoeding ondersteunende begeleiding
  - Bijvoeding op medische indicatie
    - Fingerfeeding
    - Maagsonde
    - Therapeutisch flesvoeden
    - Cupfeeding

# Begeleiding

- ▶ Borstvoeding beleid
  - Duidelijk en eenduidig
  
- ▶ Belangrijk is
  - Vakkundigheid
  - Begeleiding aangepast aan de behoefte en mogelijkheden van ouders en kind

# Opname op de couveuse afdeling

- ▶ Scheiding van moeder en kind gevolgen voor
  - Binding
  - Lactatie
  
- ▶ Ouders komen in een vreemde omgeving
  - Onzekerheid
  - Angst
  - Stress

# Opname op de couveuse afdeling

## ▶ Ouders

- Contact maken
- Kangoeroeën en huid op huid contact
- Participeren in verzorging
- Gedrag van de baby
- De ontwikkeling

# Opname op de couveuse afdeling

- ▶ Middelen:
- ▶ Camera contact
- ▶ Webcam
- ▶ Video Interactie Begeleiding
- ▶ Ouderkamer
- ▶ Tienerkamer

# Van lactatie naar het geven van borstvoeding

- ▶ Moeder:
- ▶ Huid op huid contact
- ▶ Kolven
  - Kolfdagboekje en dagelijkse begeleiding
  - Op weg naar een grote productie
  - Ideaal 800ml per etmaal
    - Riordon J.; Breastfeeding and Human Lactation 2010, pg 434
- ▶ Inzicht in ontwikkeling van haar baby

# Van lactatie naar het geven van borstvoeding


- ▶ Baby:
  - ▶ Kangoeroeën met huid op huid contact
  - ▶ Lichamelijk herstel en
  - ▶ Ontwikkeling
- 
- ▶ Stappenplan voor het aanleren van borstvoeding voor prematuur geboren

# Bijvoeding

- ▶ Afhankelijk van de
  - Ontwikkeling van de baby
  - Mogelijkheden en wensen van moeder

- ▶ Keuzen:

1. Maagsonde
2. Cupfeeding
3. Fles en speen



# Bijvoeding

## ▶ Maagsonde

- Baby's die niet zelf drinken
- Energie sparen

## ▶ Borstvoeding

### ◦ Wanneer beginnen?

- Veel oefenen
- Begeleiding bij goed aanleggen
- Tepelhoedje
  - Meier P.P. et al.; Nipple Shields for Preterm Infants: Effect on Milk Transfer and Duration of Breastfeeding. JHL 2002
- Rooming in

# Bijvoeding

## ▶ Cupje

- Als moeder er niet is
- Na borstvoeding
- M.N. Neide et al. Cup or bottle feeding for preterm infants: effects on oxygen saturation, weight gain and breastfeeding. *J.Hum Lact* 2002
- Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Cynthia R. Howard et al. *Pediatrics* 2003; 111: 511-518

# Bijvoeding

## ▶ Fles en speen

- Bij goede drinktechniek aan de borst
- Bij porties groter dan 40 ml/ keer
- Niet vaker dan het aantal borstvoedingen
  - Bij honger en onrust & moeder is niet aanwezig
- Na overleg en instemming van ouders
- Therapeutisch flesvoeden
  - Kassing,D.; Bottle-feeding as a tool to reinforce breastfeeding
  - C.R. Howard et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics 2003

# De match

- ▶ Moeder heeft ruime melkproductie
- ▶ Compensatie immatuur zuigpatroon
  
- ▶ Veel oefening
- ▶ Baby alert
- ▶ Effectief drinkpatroon
- ▶ Zuigbehoefte bij moeder bevredigen.
  
- ▶ Naar huis!